


AGENTES QUE TIENEN UN IMPACTO EN LA TERAPIA CON LEVOTIROXINA

INTERFIEREN CON LA ABSORCIÓN

- Secuestrantes de ácidos biliares
- Sucralfato
- Resinas de intercambio catiónico
- Bifosfonatos orales
- Inhibidores de la bomba de protones
- Raloxifeno^a
- Multivitamínicos (con sulfato ferroso o carbonato de calcio)
- Sulfato ferroso
- Quelantes de fosfato (sevelámero, hidróxido de aluminio)
- Sales de calcio (carbonato, citrato, acetato)
- Picolinato de cromo
- Carbón

- Orlistat^b
- Ciprofloxacino
- Antagonistas de receptores H₂^a
- Síndromes de mala absorción:
 - Enfermedad celiaca
 - Bypass Yeyunoileal
 - Cirrosis (biliar)
 - Aclorhidria
- Dieta:
 - Ingestión con alimentos
 - Jugo de toronja
 - Café expreso
 - Alimentación alta en fibra
 - Fórmula de soya (en bebés)
 - Soya



INCREMENTAN LA DEPURACIÓN

- Fenobarbital
- Primidona
- Fenitoína
- Carbamazepina
- Rifampina
- Hormona del crecimiento

- Sertralina^b
- Inhibidores de la tirosina quinasa (imatinib^b, sunitinib)
- Quetiapina^b
- Estavudina^b
- Nevirapina^{a,b}



^aImpacto incierto; ^bMecanismo incierto.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA EL PROFESIONAL DE LA SALUD

Referencia: Garber J, Cobin R, Gharib H, et al. Clinical practice guidelines for hypothyroidism in adults: cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association. *Endocr Pract* 2012;18(6):988-1028.

FP: 05044523-F